

## Biegunka u psa

Wpisany przez Maciek Sz  
środa, 11 maja 2011 22:00

---

Biegunka u psa jest jedną z najczęstszych dolegliwości z jaką właściciele zgłaszają się do lekarzy weterynarii. O biegunce mówimy gdy mamy do czynienia ze zwiększoną zawartością wody w kale (kał płynny lub półpłynny) ze zwiększoną jego ilością oraz częstotliwością wypróżnień. Kał ten często bywa z domieszką krwi i/lub śluzu.

Nieleczona biegunka może doprowadzić do poważnych zaburzeń w gospodarce wodno – elektrolitowej a tym samym do wycieńczenia organizmu a nawet śmierci. Biegunkę w zależności od czasu jej trwania dzielimy na ostrą i przewlekłą.

**Biegunka ostra** to taka , która pojawia się nagle i trwa zazwyczaj dość krótko. Takiej biegunce mogą towarzyszyć wymioty i burczenie w brzuchu.

Zwykle ulega ona samowyleczeniu przy odpowiednim postępowaniu. Najczęstsze przyczyny tego rodzaju biegunek to:

- błędy żywieniowe, związane z nietolerancją pokarmową, przejedzeniem lub gwałtowną zmianą diety
- czynniki zakaźne: bakterie, wirusy, czy pasożyty truczny leki ciała obce

**O biegunce przewlekłej** mówimy gdy występuje ona w sposób ciągły lub z przerwami dłużej niż 2 – 4 tyg. I nie leczy się objawowo. Biegunce przewlekłej mogą towarzyszyć objawy takie jak: wodobrzusze, krew w kale, obecność śluzu, parcie na kał, polifagia, utrata masy ciała. Najczęstsze przyczyny tego rodzaju biegunki to:

- nietolerancja pokarmowa
- giargioza
- choroby
- zapalne jelit np. zapalenie okrężnicy
- przerost

## Biegunka u psa

Wpisany przez Maciek Sz  
środa, 11 maja 2011 22:00

---

- flory bakteryjnej jeli
- zewnątrz
- wydzielnicza niewydolność trzustki
- choroby
- wątroby

Postępowanie diagnostyczne w przypadku biegunek obejmuje:

- dokładny wywiad
- badanie kliniczne pacjenta
- badania laboratoryjne: morfologia, biochemia, badanie kału i moczu
- badanie obrazowe ( RTG, USG)
- testy specjalistyczne :
- test Elisa w kierunku giargi
- test TLI w kierunku
- ZWNT
- poziom kwasu foliowego i kobalaminy
- biopsja

Leczenie biegunek

To co właściciel może zrobić w domu obejmuje : 24- 48 godzinna głodówkę ( później dieta lekkostrawna), woda do picia, preparatu osłaniające błonę śluzową żołądka i jeli ( np. Smekta), podanie węgla.

Jeżeli mimo tego biegunka nie mija lub jeśli towarzyszą jej inne niepokojące objawy takie jak: wymioty, wysoka temperatura, bolesność należy niezwłocznie zgłosić się z psem do lekarza weterynarii, który postara się zdiagnozować przyczynę biegunki i zaleci odpowiednie leczenie.